

# Ce que vous devez savoir sur votre médicament contre l'infection tuberculeuse latente

## ISONIAZIDE et RIFAPENTINE

Un médicament vous a été prescrit pour traiter votre infection tuberculeuse latente. Vous n'êtes pas atteint de tuberculose et vous ne pouvez pas transmettre la tuberculose à d'autres personnes. Ce médicament vous permettra d'**ÉVITER** de contracter la tuberculose.

### N'oubliez pas vos consultations hebdomadaires :

Vous verrez un professionnel de santé chaque semaine pour prendre vos médicaments. Ce dispositif est appelé traitement sous surveillance directe (DOT).

Le DOT peut vous aider sur plusieurs plans.

- Le professionnel de santé vous aide à vous rappeler de prendre vos médicaments.
- Vous terminerez votre traitement dès que possible.
- Le professionnel de santé s'assurera que les médicaments prescrits ne vous posent pas de problèmes.
- Lors de vos rendez-vous hebdomadaires, cette personne peut répondre à vos questions. Vous pouvez également lui parler de tout problème qui vous préoccupe.

### Durant la prise de ce médicament :

- ✓ Faites part à votre médecin ou à votre infirmière de vos questions ou préoccupations à propos du médicament.
- ✓ Rendez-vous aux consultations hebdomadaires.
- ✓ Parlez de toute consommation d'alcool avec votre médecin. La consommation d'alcool peut avoir des effets secondaires.
- ✓ Signalez à votre médecin tous les autres médicaments que vous prenez actuellement.
- ✓ Pensez à dire à vos autres médecins que vous êtes soigné pour une infection tuberculeuse latente.
- ✓ Certaines personnes trouvent que les médicaments les affectent moins quand ils sont pris avec de la nourriture.

### Posologie pour l'infection tuberculeuse latente :

(Prescripteurs : indiquez le jour et le nombre de comprimés appropriés)

Médicament	Posologie	Jour	Nombre de comprimés par jour	Durée
Isoniazide et Rifapentine	Une fois par semaine	L Ma Me J V S D		3 mois (12 semaines)

Votre médecin peut vous prescrire de la vitamine B6 avec votre médicament.

### REMARQUE

Nom de mon médecin :

Nom de ma clinique :

Numéro de téléphone de ma clinique :



### Soyez attentif aux problèmes suivants :

**ARRÊTEZ** immédiatement de prendre votre médicament **ET** appelez le médecin ou l'infirmière en charge du traitement de votre maladie tuberculeuse si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Diminution ou absence d'appétit
- Maux de ventre ou crampes d'estomac
- Fièvre
- Maux de tête ou courbatures
- Nausées ou vomissements
- Urine foncée ou selles pâles
- Ecchymoses ou saignements
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Faiblesse ou fatigue intense
- Picotements ou engourdissements dans les mains ou les pieds
- Vertiges

**REMARQUE :** Il est normal que votre urine, votre salive ou vos larmes prennent une teinte orangée. Les lentilles de contact souples peuvent se teinter.

# What You Need to Know About Your Medicine for Latent Tuberculosis (TB) Infection

## ISONIAZID and RIFAPENTINE

You have been given medicine to treat your latent TB infection. You do not have TB disease and cannot spread TB to others. This medicine will help you **PREVENT** getting TB disease.

### Remember to Keep Your Weekly Visits:

You will meet with a health care worker weekly to take your medicines. This plan is called directly observed therapy (DOT).

DOT can help you in several ways.

- The health care worker helps you to remember to take your medicines.
- You will complete your treatment as soon as possible.
- The health care worker will make sure you are not having problems with the medicines.
- During your weekly meetings, this person can answer your questions. You can also talk about any concerns you have.

### While on this Medicine:

- ✓ Tell your doctor or nurse if you have questions or concerns with the medicine.
- ✓ Go to weekly visits.
- ✓ Discuss any alcohol use with your doctor. Alcohol use may cause side effects.
- ✓ Tell your doctor about all other medicines you are taking.
- ✓ Be sure to tell your other doctors that you are being treated for latent TB infection.
- ✓ Some people find that the medicines affect them less when taken with food.

### Latent TB Infection Medicine Schedule:

(Providers: Indicate the appropriate day and number of pills)

Medicine	Schedule	Day	Number of pills per day	Length of time
Isoniazid & Rifapentine	Once weekly	M T W Th F S Sun		3 months (12 weeks)

Your doctor may have you take vitamin B6 with your medicine.

#### NOTES

Name of my doctor:

Name of my clinic:

Telephone number of my clinic:



### Watch for these Possible Problems:

**STOP AND** call your TB doctor or nurse right away if you have any of the problems below:

- Less appetite, or no appetite for food
- An upset stomach or stomach cramps
- Fever
- Head or body aches
- Nausea or vomiting
- Cola-colored urine or light stools
- Easy bruising or bleeding
- Rash or itching
- Yellowing skin or eyes
- Severe weakness or tiredness
- Tingling or numbness in your hands or feet
- Dizziness

**NOTE:** It is normal if your urine, saliva, or tears become orange-colored. Soft contact lenses may become stained.