

Những điều quý vị cần biết về thuốc điều trị nhiễm Lao (TB) tiềm ẩn

RIFAMPIN

Quý vị được kê thuốc điều trị nhiễm Lao tiềm ẩn. Quý vị không bị nhiễm Lao và không thể lây lan sang người khác. Thuốc này sẽ giúp quý vị **TRÁNH** bị nhiễm Lao.

Trong thời gian sử dụng loại Thuốc này:

- Trao đổi với bác sĩ hoặc y tá của quý vị khi quý vị có câu hỏi hay quan ngại về thuốc.
- Thăm khám theo đúng lịch tại phòng khám.
- Thảo luận bất kỳ việc sử dụng đồ uống có cồn nào với bác sĩ của quý vị. Việc sử dụng đồ uống có cồn có thể gây tác dụng phụ.
- Chia sẻ với bác sĩ của quý vị về tất cả các loại thuốc khác mà quý vị đang uống.
- Đảm bảo cho bác sĩ của quý vị biết là quý vị đang được điều trị nhiễm Lao tiềm ẩn.
- Uống toàn bộ thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc y tá điều trị Lao của quý vị.
- Một số người thấy rằng thuốc ít có tác dụng khi uống kèm với thức ăn.

Mẹo giúp quý vị uống thuốc:

- ✓ Uống thuốc vào cùng khung giờ như nhau vào tất cả các ngày.
- ✓ Hẹn giờ trên thiết bị hẹn giờ để nhắc quý vị uống thuốc.
- ✓ Nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè nhắc quý vị.
- ✓ Dùng một hộp đựng thuốc.
- ✓ Để mẫu giấy nhắc quý vị nhớ uống thuốc ở trên gương hoặc tủ lạnh.
- ✓ Dùng một tờ lịch đánh dấu vào ngày quý vị uống thuốc.

Lịch uống thuốc điều trị Nhiễm Lao tiềm ẩn:

(Cán bộ chăm sóc: Ghi rõ số lượng viên thuốc)

Thuốc	Lịch uống thuốc	Số viên mỗi ngày	Độ dài Thời gian
Rifampin	Hàng ngày		4 tháng

Bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu quý vị gặp một cán bộ chăm sóc y tế để dùng thuốc.

Đây được gọi là chương trình trị liệu giám sát trực tiếp (DOT).

NẾU QUÝ VỊ QUÊN UỐNG THUỐC: Nếu quên uống trong ngày, uống bổ sung đúng liều ngay khi quý vị nhớ ra. Không được uống 2 liều cùng lúc.

LƯU Ý

Tên bác sĩ:
Tên phòng khám của tôi:
Số điện thoại phòng khám của tôi:



Theo dõi phát hiện những vấn đề có thể phát sinh sau:

DỪNG thuốc ngay **VÀ** gọi cho bác sĩ hoặc y tá điều trị Lao nếu quý vị gặp phải một trong các vấn đề sau:

- Ăn kém ngon hoặc không ngon miệng
- Rối loạn hoặc co thắt dạ dày
- Buồn nôn hoặc nôn
- Nước tiểu có màu sẫm hoặc phân sáng màu
- Dễ bị bầm tím hoặc chảy máu
- Phát ban hoặc ngứa
- Da hoặc mắt vàng
- Đau ốm nặng hoặc mệt mỏi
- Sốt
- Đau đầu hoặc đau người
- Hoa mắt chóng mặt

LƯU Ý: Không có gì bất thường nếu nước tiểu, nước bọt hoặc nước mắt có màu cam. Kính áp tròng mềm có thể bị mờ bẩn.