

ተደብቆ ስለሚቆይ ሳምባነቀርሳ (TB) ኢ.ፌ.ክሸን መድሀኒት ሊያውቁት የሚያስፈልግ ነገር

RIFAMPIN

ተደብቆ የሚቆይ TB ኢ.ፌ.ክሸን ለማከም ይህን ዘንድ መድሀኒት ተሰጥታል። TB የሌለብዎ ሲሆን እርሶ ወደሌሎች TBን ሊያስተላልፉ አይችሉም። ይህ መድሀኒት በ TB በሽታ ከመያዝ ይከላከልዎታል።

ይህንን መድሀኒት በመውሰድ ወቅት፡

- የሚያሳሱብዎ ነገር ያለ እንደሆነ ለሀኪምዎ ወይም ለነርሶዎ ያሳውቁ።
- ወደ ታቀደው የክሊኒክ ጉብኝት ይሂዱ።
- ምንም አይነት የአልኮል መጠጥ የ ሚጠቀሙ አንደሆነ ለሀኪምዎ ያሳውቁ። አልኮል የጎንዮሽ ጉዳት እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል።
- ለሀኪምዎ ስለሚወስዱት ሌሎች መድኃኖች ያሳውቁ።
- ለሌኛው ሀኪምዎ መድሀኒት እየወሰዱ ያሉት ለተደበቀ የ TB ኢ.ፌ.ክሸን እንደሆነ ማሳወቅዎትን አርግጠኛ ይሁኑ።
- መድሀኒቶችዎን በሙሉ በሀኪምዎ ወይም በነርሶዎ እንደተነገርዎ ይውሰዱ።
- አንዳንድ ሰዎች መድሀኒቱን ከምግብ ጋር በሚወስዱበት ወቅት መድሀኒቱ የሚፈጥረውን ተጽእኖ እንደሚቀንሰላቸው አሳውቀዋል።

መድሀኒቶችዎን ለመውሰድ አርዳታ የሚያደርጉ አንዳንድ ምክሮች፡

- ✓ መድሀኒትዎን አንድ አይነት ሰዓት ላይ በየእለቱ ይውሰዱ።
- ✓ መድሀኒትዎን በሚወስዱበት ሰዓት ላይ ማስታወሻ ይሆን ዘንድ የማንቁያ ደውል ያደርጉ።
- ✓ የቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ እንዲያስታውሱዎ ይጠይቁ።
- ✓ ፒልሶክሰን ይጠቀሙ።
- ✓ በመስታወት ላይ ወይም ማቀዝቀዣ ላይ ማስታወሻ እንዲቀመጥ ያደርጉ
- ✓ ቀኑ ላይ ምልክት ያደርጉ ዘንድ የቀን መቁጠሪያ ያስቀምጡ።

የተደበቀ የ TB ኢ.ፌ.ክሸን መድሀኒት መርሀግብር፡

(አቅፋቢዎች፡ ትክክለኛውን መርሀ ግብር፣ ቀናት እና የኪኒኖች ቁጥር ያመለክታሉ)

መድሀኒት	መርሀግብር	እለታዊ የኪኒን ቀናት	የጊዜው ርዝመት
Rifampin	በየእለት		4 ወራት

መድሀኒትዎን ይወስዱ ዘንድ ሀኪምዎ ከጤና ባለሙያ ጋር እንዲገናኙ ሊያደርግ ይችላል። ይህም በቀጥታ የሚታይ ህክምና (DOT) በመባል ይታወቃል።

መድሀኒት መውሰድ የሚረሱ አንደሆነ፡ እለቱ ያው ከሆነ መድሀኒቱን አንዳስታውሱ ወዲያው ይውሰዱ። በአንድ ጊዜ ሁለት መድሀኒት ይውሰዱ።

ማስታወሻ
የሀኪሜ ስም፡
የክሊኒክ ስም፡
የክሊኒክ ስልክ ቁጥር፡



እነዚህን ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች ይመልከቱ፡

መድሀኒትዎን ወዲያው መውሰድዎትን **ያቁሙ** እና ለ TB ሀኪምዎ ወይም ነርሶ በመደወል ምንም አይነት ችግር የሚያጋጥም አንደሆነ ያሳውቁ፡

- ዝቅተኛ የሆነ የምግብ ፍላጎት፣ ወይ ምንም የምግብ ፍላጎት
- የታመመ ሆድ ወይም ቁርጠት
- ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስ
- ኮላ - ቀለም ያለው ሽንት ወይም ቀለል ሰገራ
- በቀላሉ መቁሰል ወይም መድማት
- ሽፍታ ወይም ማሳከክ
- የቆዳ ወይም አይን ቢጫ መሆን
- ከፍተኛ ድካም ወይም መዳከም
- ትኩሳት
- የራስ ወይም ሰውነት ህመም
- ማዘር

ማስታወሻ፡ ሽንት፣ ምራቅ ወይ እምባ ቡርትካናማ ቀለም ያለው የሆነ እንደሆነ ምንም አይነት። ለስላሳ ኮንታክት ሌንሾችም ቀለማቸው ሊለወጥ ይችላል።