

Ce que vous devez savoir sur votre médicament contre l'infection tuberculeuse latente

RIFAMPICINE (RIFAMPIN)

Un médicament vous a été prescrit pour traiter votre infection tuberculeuse latente. Vous n'êtes pas atteint de tuberculose et vous ne pouvez pas transmettre la tuberculose à d'autres personnes. Ce médicament vous permettra d'**ÉVITER** de contracter la tuberculose.

Durant la prise de ce médicament :

- Faites part à votre médecin ou à votre infirmière de vos questions ou préoccupations à propos du médicament.
- Rendez-vous aux consultations planifiées.
- Parlez de toute consommation d'alcool avec votre médecin. La consommation d'alcool peut avoir des effets secondaires.
- Signalez à votre médecin tous les autres médicaments que vous prenez actuellement.
- Pensez à dire à vos autres médecins que vous êtes soigné(e) pour une infection tuberculeuse latente.
- Prenez tous vos médicaments conformément aux prescriptions de votre médecin ou de votre infirmière.
- Certaines personnes supportent mieux les médicaments quand ils sont pris avec de la nourriture.

Conseils pour vous faciliter la prise de votre médicament :

- ✓ Prenez votre médicament chaque jour à la même heure.
- ✓ Programmez une alarme de rappel à l'heure où vous devez prendre votre médicament.
- ✓ Demandez à un membre de votre famille ou à un ami de vous y faire penser.
- ✓ Utilisez un pilulier.
- ✓ Placez un pense-bête sur votre miroir ou votre réfrigérateur.
- ✓ Utilisez un calendrier pour cocher le jour où vous prenez votre médicament.

Posologie pour l'infection tuberculeuse latente :

(Prescripteurs : indiquez le nombre approprié de comprimés)

Médicament	Posologie	Nombre de comprimés par jour	Durée
Rifampicine (Rifampin)	Quotidiennement		4 mois

Votre médecin pourra vous mettre en contact avec un professionnel de santé chargé de vous faire prendre vos médicaments.

Ce dispositif est appelé traitement sous surveillance directe (DOT).

SI VOUS OUBLIEZ DE PRENDRE VOTRE MÉDICAMENT : Si cet oubli a lieu le jour même, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Ne prenez pas 2 doses en même temps.

REMARQUE

Nom de mon médecin :

Nom de ma clinique :

Numéro de téléphone de ma clinique :



Soyez attentif aux problèmes suivants :

ARRÊTEZ immédiatement de prendre votre médicament **ET** appelez le médecin ou l'infirmière en charge du traitement de votre maladie tuberculeuse si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Diminution ou absence d'appétit
- Maux de ventre ou crampes d'estomac
- Nausées ou vomissements
- Urine foncée ou selles pâles
- Ecchymoses ou saignements
- Éruption cutanée ou démangeaisons
- Jaunissement de la peau ou des yeux
- Faiblesse ou fatigue intense
- Fièvre
- Maux de tête ou courbatures
- Vertiges

REMARQUE : Il est normal que votre urine, votre salive ou vos larmes prennent une teinte orangée. Les lentilles de contact souples peuvent se teinter.