

Что нужно знать о препарате для лечения латентной инфекции туберкулезом (ТБ)

РИФАМПИН

Вы получили препарат для лечения латентной инфекции ТБ. Вы не больны ТБ и не можете заразить им других людей. Этот препарат поможет вам **ПРЕДОТВРАТИТЬ** заболевание ТБ

В ходе приема препарата:

- Если возникнут какие-либо вопросы или проблемы, связанные с этим препаратом, обратитесь к своему врачу или медсестре.
- Совершайте все запланированные визиты в клинику.
- Обсудите употребление алкоголя с врачом. Алкоголь может вызывать побочные эффекты.
- Расскажите своему врачу обо всех других лекарствах, которые принимаете.
- Обязательно сообщите другим врачам, что проходите лечение латентной инфекции ТБ.
- Принимайте все лекарства, рекомендованные лечащим врачом или медсестрой.
- Некоторые считают, что лекарство действует слабее, если принимать его с пищей.

Как принимать препарат:

- ✓ Принимайте его в одно и то же время каждый день.
- ✓ Установите напоминание о времени его приема.
- ✓ Попросите члена семьи или друга напоминать вам.
- ✓ Пользуйтесь контейнером для таблеток.
- ✓ Прикрепите листок с напоминанием на зеркало или холодильник.
- ✓ Пользуйтесь календарем, чтобы отмечать день приема препарата.

График приема препарата для лечения латентной инфекции ТБ:

(Совет: укажите соответствующее число таблеток)

Препарат	График	Таблеток в день	Продолжительность курса
РИФАМПИН	Ежедневно		4 месяца

Врач может назначить патронажную сестру для обеспечения приема вами лекарства. Это называется лечение под непосредственным наблюдением.

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕПАРАТ: Если день не закончился, следует принять его даже позже. Нельзя принимать 2 дозы одновременно!

ПРИМЕЧАНИЕ

Имя и фамилия врача:
Название клиники:
Телефон клиники:



Контроль возможных побочных действий:

ПРЕКРАТИТЕ прием препарата немедленно **И** свяжитесь с лечащим врачом или медсестрой при возникновении следующих проблем:

- Снижение или потеря аппетита
- Расстройство или спазмы в желудке
- Тошнота или рвота
- Темный цвет мочи или светлый стул
- Небольшие гематомы или кровотечения
- Сыпь или зуд
- Пожелтение кожи или глаз
- Сильная слабость или усталость
- Жар
- Головная боль или ломота в теле
- Головокружение

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша моча, слюна или слезы могут изменить цвет на оранжевый; это нормально. Мягкие контактные линзы могут окрашиваться.